



Nr / 2025

CUM SA NE FERIM DE GRIPA AVIARA

Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Europei sub raportul evolutiei Influenzei aviare, precum si prezenta unor focare in S.U.A. fiind raportat si primul deces, posibilitatea raspandirii acestei boli la specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care se instituie o stare de alerta permanenta privind anuntarea in timp util catre DSVSA Calarasi a oricarui caz de morbiditate si / sau mortalitate la pasarile domestice sau pasarile salbatice pentru a interveni cu maxima responsabilitate in teritoriu.

INFORMAȚII DESPRE GRIPĂ AVIARĂ

Este o boală produsă de un virus, care produce îmbolnăviri la curci, rațe, găște, potârniche, fazani, găini, pasări acvatice și migratoare.

Boala se răspândește foarte repede și afectează un număr mare de pasări .

Pasările migratoare și în special cele de apă sunt considerate rezervorul de virus pentru gripa aviară.

Porcul, calul și alte specii, se pot infecta, nu se îmbolnăvesc , dar pot transmite boala păsărilor sau altor specii, și in condiții deosebite, omului.

Boala se transmite de la pasările migratoare, de la pasările bolnave, cadavrele, secrețiile si excrețiile păsărilor infectate, apa, furajele, echipamentele, adăposturile, mijloacele de transport, care au fost în contact cu virusul.

Cu cât contactul dintre păsările eliminatoare și cele receptive este mai strâns, cu atât mai ușor se poate transmite infecția direct, pe cale respiratorie sau digestivă.

CUM SE MANIFESTĂ

Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta și bărbițele umflate, de culoare roșu închis, au pete roșii de culoare roșu închis pe picioare și scurgeri de secreții din cioc și nări.

Capul și gatul sunt umflate, colorate roșu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree și pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului și paralizii.

CRESCATORI DE ANIMALE DIN GOSPODARII TREBUIE SA RESPECTE :

Măsurile de biosecuritate reprezintă prima linie de protecție împotriva introducerii și răspândirii gripei aviare la pasări

Printre acestea se numără:

- restricționarea accesului păsărilor sălbatice la păsările de curte și a contactului cu acestea;
- evitarea iazurilor sau a altor suprafețe de apă din spațiile de pasări de curte la care ar avea acces păsările sălbatice;





- izolarea păsărilor domestice în interior cât mai mult posibil în perioadele cu risc ridicat;
 - restricționarea accesului persoanelor la adăposturile pentru păsări de curte.
-
- anunțați medicului veterinar orice caz de îmbolnavire sau moarte la pasari;
 - nu veniți în contact direct cu cadavrele pasărilor
 - țineți pasările închise în curte, pentru a evita contactul cu pasările din alte gospodării sau cu pasările salbatice
 - nu lăsați ratele și gastele pe balti sau lacuri
 - supravegheați copiii !! nu îi lăsați să se joace cu pasările sau cu cadavrele de pasari
 - acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar și autorităților responsabile

Este sigur să se consume carne de pasăre și produse din carne de pasăre?

Potrivit EFSA, nu există nicio dovadă că gripa aviară poate fi transmisă oamenilor prin consumul de produse provenite de la păsări de curte contaminate. În orice caz, carnea și produsele de pasăre provenite de la efectivele infectate sunt distruse și nu intră în lanțul alimentar. Manipularea în condiții de siguranță a cărnii crude și a altor ingrediente alimentare crude, gătitul temeinic și buna igienă a bucătăriei pot preveni sau reduce riscurile prezentate de alimentele contaminate.

Ce măsuri trebuie luate atunci când se constată prezența gripei aviare la păsările de curte pentru a preveni răspândirea infecțiilor?

- În conformitate cu legislația UE privind sănătatea animală, trebuie luate măsuri de eradicare de îndată ce se detectează gripa aviară înalt patogenă.
- Autoritățile statelor membre trebuie să pună imediat în aplicare măsuri de eradicare a bolii în unitatea infectată, inclusiv sacrificarea tuturor păsărilor, eliminarea în condiții de siguranță a carcaselor și a materialelor potențial contaminate, precum și curățarea și dezinfectarea. În plus, trebuie stabilită o zonă de restricție de cel puțin 10 km în jurul unității afectate, cu măsuri de control suplimentare aplicate unităților din zona în care sunt ținute păsări.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sănătatea dumneavoastră și a animalelor dumneavoastră .

Numar de telefon DSVSA Calarasi : 0242 / **313676** .

**DIRECTOR EXECUTIV ,
Dr. Gheorghe DRAGANICA**





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CĂLĂRAȘI

